4) Martens, G. v.: Die Tange. 1866. p. 111.
5) Collins, F. S.: The Green Algae of North America, Supplementary Paper. 1912. p. 97. Pl. I. f. 9.
6) Wittrock, V. B.: Ibid. p. 52.
7) Collins, F. S. Ibid. 1912. p. 98.

●讀者諸氏ニ御願ヒ……本屬以外何種ノ淡水藻ニテモ御採集ニ相成リタルトキハ御分與下サレンコトヲ懇願致シマス、材料ハ出來ルコトナラバ生ノ儘カ或ハ十「パーセント」位ノ「ホルマリン」漬ナレバ尚更ヲ好都合デアリマス

【牧野云フ】東君ハ本邦淡水産藻類ノ研究者デ造詣頗ル深キモ尚ホ吃々トシテ研鑽ヲ續ケテ居ラレル篤學ノ士デアリマス、我邦各地ニあるみどろナドヲ始トシテ淡水産藻類非常ニ多キモ普通ノ人々ニハ其名稱ノ判然セザルモノ極メテ夥シク若シ一朝之レガ判カッタ曉ニハドレ程知識ヲ增シ興味ヲ感ズルカ殆ンド料リ知ルベカラザル事デアラウト思フ、前述ノ樣ニ東君モアノ通リ切望シテ居ラレル故諸君モ成ルベク其レヲ採集シテ送ッテ上ゲタラドンナモンダラウ、サウスレバ東君モ不斷ノにこ〳〵顏ヲ彌ヤガ上ニモにこ〳〵サスシ又送ッ方モ其名稱ナドヲ同君ニ教ヘテ貰フ事ヲ得謂ユル一擧兩得ノ利益ヲ享クル事ガ出來誠ニ結構至極ナ事デハナカラウカ、其レガ延イテハ斯學ノ進歩ヲ助クル結果ヲ將來スル事ヲ想ヘバ是レハ亦極メテ大切ナ事デアルトモ謂ヘル、單ニ趣味トシテデモ之レヲ採テ來テ一度顯微鏡下ニ窺フテ見タマヘ其見エテ居ル所マルデ憂キ世ノ外ノ別世界デ夫レヲ見テ居ルト自分ハトテモ此うるさい人間社會ニ居ル樣ナ氣ガシナイ、チョッデモサウ云フ塵外味ヲ味フニハ他ニ優レテ持ッテ來イノ淡水産藻類デアル、千狀萬態ノ形體、多樣ナル模樣、鮮美ナル色彩、誠ニ見テモ〳〵飽カヌ眺メデアル

○植物新産地一束

東京帝國大學理學部植物學教室　正宗巖敬

るりしゃくぢゃう（Burmannia Itoana Mak.）本種ハ琉球列島ノ八重山諸島ノ一部デ發見サレタ者デ本列島中奄美大島マデ分布シテヰル事ハ判カッテ居タガ、本夏余ハ此ヲ屋久島ノ南側ニ得タノデ今ノ所本島ヲ其北限ノ産地ト考ヘル事ガデキル、屋久島ニハ本種ノ他ニ尚ホ同科ノ**しろしゃくぢゃう**、**ひなのしゃくぢゃう**ヲ産スル、**ほそばおほかぐま**（Woodwardia Takeoi Hay.）ハ臺灣デ最初ニ發見サレ上記ノ學名ガ與ヘラレタ羊齒デ原産地ニ

モアマリ多クナイサウデアルガ屋久島ノ森林中ニハ可ナリ多量ニ見受ケラレル、屋久島ニハ此他ニ臺灣琉球方面ニ關係ノアル植物ガ次第ニ發見サレル今其内氣付タ者ノ二三ヲ記スト、**ひりゅうしだ**、**しまあをねかづら**、**たいわんひめわらび**(寫眞ヲ見ヨ)、**うすばくじゃく**、**ほそばはちぢゃうした**、**ほこざきうらぼし**、**ほそひもやうらくひば**(Lycopodium tereticaule Hay.)**やうらくひば**、**こぶらん**、**いなばらん**、**しましゅすらん**等デ尚ホ穿鑿ノ進ムニツレ共通種ガ多ク發見サレテ來ルニ違ヒナク屋久島ト奄美大島トノ間ニ植物分布上重要ナ分布境界線ガ引ケルトノ考ハ次第ニ其影ガ薄クナリ其分布線ハホンノ二次的ノ者デアル事ガ證明サレル時ガ來ルノデハナイカトモ思ハレル、**みやじましだ**ハ九州南部ノ高隈山、紫尾山等ニ產スル事ハ知ッテ居タガ屋久島ニモ多量ニ產スル事ガ分ッタ、**かねこしだ**ハ佐賀縣ノ黑髮山ト鹿兒島縣ノ高隈山ニ產スル事ハ知ッテ居タガ本年屋久島ノ一部デ**やくしまざさ**ニ交ッテ生エテ居ルノヲ見タ、**くさまるはち**ハ土佐ノ一部ト奄美大島及琉球本島ニ產スル事ハ知ッテ居タガ屋久島ニモ相當多量ニ生育シテ居ル事ヲ近年明カニシタ、**こたねきらん**(**すげ**屬)ハ四國ノ劍山ヲ南限トスルト考ヘテ居タ所此夏屋久島ノ永田岳ノ一八〇〇米邊ニ生育シテ居ルノヲ見タ此ガ恐ラク南限ノ產地デアラウ、**はひこもちしだ**ハ

たいわんひめわらび
(Acrophorus stipellatus Moore.)
(正宗嚴敬撮影)

伊豆半島ノ淨蓮ノ瀧ノ一局部ニノミ產スル者トノミ考ヘテ居タガ先日伊豆半島ニ採集ニ行ッタ際其レガ同州仁科村ノ一部ニ多量ニ產スル事ヲ知ッタ

○やましゃくやくトべにばなやましゃくやく

駿州、沼津市、上香貫　山出半次郎

曩ニ發行ニナッタ『植物研究雜誌』第三卷ノ第六號ニ武田博士ノ此等ニ就テノ論說ガアリ爲メニ多大ノ參考トナッタガ小生ハ左ノ點ニ就キ兩者間ニ明カニ差違ノアル樣ニ感ズルノデ今夫レヲ略述シテ見ヤウ

紅花種即チべにばなやましゃくやくハ產スルコト割合ニ少ナク、莖ハ高サ一二尺ニ達スル、之ヲ白花種ノやましゃくやくニ比ブレバ春葉ヲ展ブルモコトモ遲ク又花期モ後レル、根ハ直立シテ深ク地中ニ入リ年々肥大シ、芽ハ白ク地中ノ深處ニ在テ根ノ各部カラ多數ニ生ズル

白花種デアル常品ノやましゃくやくハ普通ニ產シ、莖ハ低ク一尺以上ハ稀デアル、根ハ匾平デ伏臥シ經年ノモノハ一尺餘ノ長サガアル、芽ハ色赤ク、每歲根ノ前部ニ發出シ後部ニ生ズルコトナク即チ地中ニ淺在シテ殆ンド地表ニ出デントシテ居ル

やましゃくやくハ森林中ノ陰地ニ適シテ腐植土ニ生ジ林木伐採ニヨリ其處ガ裸出地トナレバ自然ニ消滅スル、之ニ反シべにばなやましゃくやくハ岩石質ノ地ニ生ジ陽地ニ在レバ繁茂スルガ林樹生長シテ陰影多クナレバ却テ自然ニ消滅スル

伊藤圭介氏著『日本產物志』武藏部ニやましゃくやくノ圖說ガアル今參考ノ爲メニ其文ヲ此ニ鈔出スル○ヤマシャクヤク（クサボタン、ボタンゲサ草芍藥 崔豹古今注）武州（秩父山、御嶽山）城州（大悲山、芳生山）江州（伊吹山）濃、信、野、等諸州深山ニ自生ス此草ノ狀芍藥ニ似テ小ナリ花モ亦相似テ小ク單瓣白色穀雨後ニ開ク又淡紅ノ者アリ莖高ク葉モ大ナリコノ實狀鋤柄ニ似タルヲ以テ、ヤマシャクジャウ（信州）ノ名アリ小暑後コノ房開裂ス其仁熟セザル者ハ小クシテ紅色熟スル者ハ圓大ニシテ瑠璃色ニ變ズ甚ダ美ナリ根ハ外皮白色、內黑ヲ帶ブ藥舖ニテ此品ヲ宇陀芍藥、信濃芍藥ト呼ブハ各出處ニ因テ其名ア